

<b>Blut- und Lymphsystem</b>
------------------------------

Gradation					
GNr:	I	II	III	V	VI
9		<p>Anamnestisch häufiger auftretende reaktive Lymphknotenschwellungen ohne Krankheitswert.</p> <p>Zustand nach operativer Lymphknotenausräumung bei gutartiger Grunderkrankung.</p>	<p>Anamnestisch angegebene Hämolyse ohne Folgen.</p> <p>Auch längerbestehende, geringfügige gutartige Lymphknotenschwellungen oder Milzvergrößerung ohne Krankheitswert.</p> <p>Leukozytose ohne Krankheitswert.</p> <p>Thrombozytopenie und/oder Leukopenie ohne Krankheitswert.</p> <p>Geringfügige Anämie ohne Therapiebedürftigkeit und ohne zugrunde liegende ernsthafte Erkrankung.</p>	<p>Therapiebedürftige ausgeprägte Anämie (z. B. Blutungs-, Eisenmangel-, Infektanämie).</p> <p>Rückbildungsfähige reaktive Blutzellenvermehrung.</p> <p>Rückbildungsfähige, nicht neoplastische akute Lymphknotenschwellung mit Krankheitswert.</p> <p><b>Nachuntersuchung spätestens nach 12 Monaten.</b></p>	<p>Thalassaemia minor.</p> <p>Therapieresistente Anämie, Leukopenie oder Thrombopenie.</p> <p>Nachgewiesene Hämolyse mit Anämie, hämolytischer Krise oder deutlicher Milzvergrößerung.</p> <p>Neoplasien des blutbildenden oder lymphatischen Systems.</p> <p>Erhebliche Gerinnungsstörungen, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manifestation des v. Willebrand-Jürgens-Syndroms und anderer Hämophilien.</li> <li>- Mangel an Inhibitoren des Gerinnungssystems mit Thrombosegefährdung (u. a. APC-Resistenz).</li> </ul> <p>Primäres familiäres Lymphödem.</p>