

Venen
-------

Gradation					
GNr:	I	II	III	V	VI
69		Geringe Erweiterung einzelner Blutgefäße an den Beinen ohne Schwellneigung (retikuläre Varikosis, Besenreiserstrukturen, Corona phlebectatica paraplantaris).	<p>Krampfadern bis mittleren Grades, auch mit leichter Schwellneigung, bzw. operierte Krampfadern geringen Ausmaßes.</p> <p>Chronisch-venöse Insuffizienz I. Grades.</p> <p>Einmalige, folgenlos abgeheilte Thrombophlebitis im Bereich der unteren Extremitäten.</p> <p>Folgenlos abgeheilte, mehr als 6 Monate zurückliegende Thrombose einer tiefen Beinvene ohne erhöhtes Thromboserisiko (keine anatomische und/oder genetische Prädisposition).</p>	<p>Behandlungsbedürftige Krampfadern, soweit eine Behandlung eingeleitet wurde oder beabsichtigt ist.</p> <p>Zustand nach Krampfader-Operation, soweit noch keine 6 Monate zurückliegend.</p> <p>Noch nicht 6 Monate zurückliegende Thrombose einer tiefen Beinvene ohne erhöhtes Thromboserisiko.</p> <p>Ulcus cruris, dessen Abheilung bei geeigneter Behandlung innerhalb befristeter Zeit zu erwarten ist.</p> <p><b>Nachuntersuchung spätestens nach 6 Monaten.</b></p>	<p>Krampfadern stärkeren Grades und/oder chronisch-venöse Insuffizienz ab Grad II mit Ablehnung der Operation.</p> <p>Rezidivierende Thrombophlebitiden.</p> <p>Zustand nach Thrombophlebitis mit bleibenden, die Funktion beeinträchtigenden Veränderungen.</p> <p>Zustand nach Thrombose mit erhöhtem Thromboserisiko und/oder mit bleibenden Schäden (u. a. postthrombotisches Syndrom, Ulcus cruris).</p>

**Anmerkung:**

- In Zweifelsfällen ab Gradation III fachärztliche Untersuchung mit Duplexsonographie erforderlich.